




ไข้เลือดออก

โรคร้าย ที่มีอยู่หลายเป็นพาหะ

โรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี และมีอยู่หลายเป็นพาหะของโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้มี 4 ชนิด ผู้ที่เคยป่วยแล้วก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกัน หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควรไปพบแพทย์



อาการ




ไข้สูงลอย
39-40 องศา
ประมาณ 2-7 วัน
ปวดเมื่อยตามตัว
ปวดศีรษะ



อาการเลือดออก
ถ่ายดำ อาเจียน
มีจุดเลือด
ออกตามตัว



ตับโต
มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครง
ข้างขวา



ระบบไหลเวียนเลือด
ผิดปกติ หรือมีภาวะช็อก
ช่วงไข้จะลด จะกระสับกระส่าย
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว
ความดันต่ำ



บางรายอาจพบ
อาการรุนแรง
เช่น ไตวาย
เกล็ดเลือดต่ำ
มีการรั่วของพลาสมา

การรักษา



ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้
คือ "พาราเซตามอล" ห้ามใช้แอสไพริน


ดื่มน้ำให้เพียงพอ ในรายที่ขาดน้ำ
ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆ

ดูอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการ
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน
ใจสั่น หน้ามืด ในช่วงไข้ลด ให้นำส่งรพ. ทันที

การป้องกัน



ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
กำจัดภาชนะที่มีน้ำขังในบริเวณบ้าน เช่น
ยางรถยนต์ ถัง ขวดน้ำ อ่างน้ำ เป็นต้น



ใช้สารเคมี เช่น ทรายอะเบท และยาฆ่าลูกน้ำ
ใส่ในบ่อน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้าน และแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย



ปกป้องร่างกาย ด้วยการใส่เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว ใช้ยาทากันยุง ฯลฯ

ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข